

De impact van Q-koorts op arbeid en psychosociaal functioneren van Q-koorts en QVS patiënten

Projectgegevens:

Hoofdaanvrager: Dr. J.L.A. Hautvast & Drs. J.A.F. van Loenhout

Organisatie: Radboud UMC / AMPHI

Bedrag: € 276.972

Kenmerk: AMPHI140926-00

Looptijd: 2015 – 2017

Dit onderzoek laat zien welke problemen op het gebied van arbeid en psychosociaal functioneren patiënten nog hebben 5-9 jaar nadat ze ziek zijn geworden van Q-koorts en welke behandeling daarin het meest effectief zijn gebleken. Tevens toont het welk deel van de Q-koortspatiënten nog problemen ervaart op dit gebied. We kijken daarbij naar ervaren problemen op het gebied van werk:

- Welk deel van de patiënten kan niet of minder werken, en welk deel is ondertussen wel (weer) aan het werk?
- Hoe komt het dat sommigen wel (weer) kunnen werken en anderen niet?
- Zijn er patiënten in de UWV gekomen, en hoe loopt dat nu?
- Hoe gaat het op de werkvloer, is daar begrip voor de klachten van patiënten?

En we kijken psychosociale klachten:

- Hoe is het de kwaliteit van leven, vermoeidheid en het gevoel van gezond zijn?
- In welke mate hebben patiënten hun ziekte q-koorts geaccepteerd?
- In hoeverre ervaren patiënten belemmeringen in hun activiteiten?
- Hoe is het de concentratie en het geheugen van patiënten gesteld?
- Wat voor effect heeft de ziekte op de patiënt en diens partner?

Omdat een groot deel van de patiënten al in eerdere onderzoeken meegedaan heeft, kunnen we ook bekijken of patiënten nu vooruit zijn gegaan qua o.a. vermoeidheid en acceptatie van ziekte, of dat de problemen mogelijk ernstiger zijn geworden.

Ook kunnen we nagaan welk deel van de grote groep Q-koorts patiënten nog klachten heeft zo lang na de start van de ziekte, en onderzoeken wat voor type patiënten het meest last houden van problemen (qua geslacht, leeftijd, etc.).

Verder zullen we in kaart brengen welke behandelingen patiënten gevolgd hebben om de problemen van hun klachten te verhelpen. Indien er voldoende patiënten met het onderzoek meedoen kunnen we onderzoeken welke behandelingen beter of minder geholpen hebben, waardoor we advies kunnen uitbrengen over de meest effectieve behandeling naar de langdurige klachten door Q-koorts. Tenslotte is het noodzakelijk om de gegevens die we bij Q-koorts patiënten verzamelen te vergelijken met mensen die niet de diagnose Q-koorts hebben gehad; dan is pas goed te zien welke problemen specifiek zijn voor Q-koorts patiënten, en waar anderen geen of minder last van hebben. Deze studie zal dus belangrijke informatie verschaffen voor zowel patiënten, als zorgverleners, als de overheid over de impact die de Q-koorts epidemie heeft gehad voor het werk en psychosociaal functioneren voor allen die Q-koorts hebben opgelopen.