

Geachte collega,

Enige tijd geleden is er een patiënt met chronische Q-koorts en anticoagulantia gebruik overleden aan een nabloeding na een extractie bij zijn tandarts.

Daarom vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Chronische Q-koorts is een langdurige infectie met de bacterie *Coxiella burnetii*. Meestal veroorzaakt het een endocarditis, infectie van klep-of vaatprothesen of infectie van aneurysmata van de aorta. Patiënten worden jaren behandeld met een combinatie van antibiotica (vaak doxycycline) en hydroxychloroquine.

Het is een zeldzame ziekte waarover nog veel onbekend is. De laatste jaren worden vaker andere uitingen van de ziekte gezien waaronder osteomyelitis. Ook van de kaak.

Bij een tandextractie is daarom mogelijk een verhoogde kans op een nabloeding. Daarom vragen wij u extracties bij patiënten met chronische Q-koorts te beschouwen als een gecompliceerde extractie en dusdanig te behandelen.

Met vriendelijke groet,

Alfons Olde Loohuis

Evan Hartman

Medisch adviseurs Q-support

Bron:

S.P. Keijmel et al. A fatal case of disseminated chronic Q-fever: a case report and brief review of the literature. Springerlink.com. 03-03-2016.