

Instructie verwijzen

U wordt door Innatoss op de hoogte gesteld van de uitslag en de betekenis van het bloedonderzoek. U stelt de patiënt op de hoogte van de uitslag. Indien er bij een patiënt aanwijzingen voor chronische Q-koorts zijn aangetroffen, verwijst u deze patiënt door naar één van onderstaande internist-infectiologen. U kunt via Zorgdomein verwijzen.

Bij “*voorkeur specialist*”: Naam van 1 van onderstaande specialisten

Bij “*reden van verwijzing*”: Verdenking chronische Q-koorts op basis van **Q-screen**

U kunt dit consult als een reguliere verwijzing declareren.

Deze Internist-infectiologen zijn op de hoogte van de Q-screen. Zij triëren de verwijzingen zelf. De gemiddelde wachttijden zijn 1 tot maximaal 4 weken.

- Chantal Rovers, Radboudumc in Nijmegen (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – Q-koorts expertisecentrum)
- Corine Delsing, Medisch Spectrum Twente in Enschede (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)
- Jacqueline Buijs, Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)
- Jan-Jelrik Oosterheert, UMC Utrecht in Utrecht (Kies: Interne geneeskunde – infectieziekten – regulier)
- Kitty Slieker, Bernhoven ziekenhuis in Uden (Kies: Interne geneeskunde – infectieziekten – Q-koorts verwijsafpraak)
- Linda Kampschreur, Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden (Kies: Interne geneeskunde – infectieziekten – regulier)
- Marjan van Apeldoorn of Thijs ten Doesschate, Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)
- Marjo van Kasteren, Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg (Kies: Interne geneeskunde – Infectieziekten – regulier)